

Χρόνια Κνίδωση

Ενημερωτικό υλικό για πληροφόρηση των ΜΜΕ



Τα συμπτώματα διαρκούν έξι εβδομάδες ή περισσότερο^{1,2}:



Πομφόι με συνοδό αίσθημα καύσου ή νυγμού



Επίμονος κνησμός



Αιφνίδιο και μερικές φορές επώδυνο οίδημα στις βαθύτερες στοιβάδες του δέρματος, συχνότερα σε πρόσωπο ή άκρα

Έως και τα δύο τρίτα των ανθρώπων με χρόνια κνίδωση πάσχουν από χρόνια αυθόρμητη κνίδωση - μία μορφή της νόσου που μπορεί να εμφανιστεί απρόβλεπτα χωρίς κάποιον ανιχνεύσιμο εκλυτικό παράγοντα¹.

Η δυσάρεστη επίδραση της χρόνιας κνίδωσης δεν περιορίζεται μόνο στο δέρμα³:

Μπορεί να υπάρχει δυσκολία στο νυχτερινό ύπνο ή ψυχολογική επιβάρυνση ...

Οι άνθρωποι με χρόνια κνίδωση αναφέρουν:

■ Διαταραχές του ύπνου, συμπεριλαμβανομένης της αϋπνίας

■ Άγχος

■ Κατάθλιψη

... σχεδόν με διπλάσια συχνότητα σε σχέση με τους ανθρώπους που δεν έχουν την πάθηση.



δυσκολία κατά την εργασία ...

Οι άνθρωποι με χρόνια κνίδωση αναφέρουν:

■ Ότι καταλήγουν να εργάζονται ασθενείς και έχουν κακή απόδοση

... σχεδόν με διπλάσια συχνότητα σε σχέση με τους ανθρώπους που δεν έχουν την πάθηση.

... και διατάραξη της καθημερινότητας από τις επισκέψεις στον γιατρό.

Οι άνθρωποι με χρόνια κνίδωση επισκέπτονται:

■ Ιατρεία (οικογενειακός ιατρός, αλλεργιολόγος, δερματολόγος)

■ Τμήματα επειγόντων περιστατικών

... σχεδόν με διπλάσια συχνότητα σε σχέση με τους ανθρώπους που δεν έχουν την πάθηση.



Τα άτομα με χρόνια κνίδωση μπορεί να χρειαστούν έως και 5 έτη για να βρουν την κατάλληλη για αυτά θεραπεία¹.

Σε ποσοστό έως και **50%** των ασθενών βρίσκουν ότι τα αντιισταμινικά δεν ανακουφίζουν επαρκώς τα συμπτώματά τους.¹



Μπορεί να γίνει συζήτηση με το γιατρό για τα συμπτώματα, καθώς και ενημέρωση για το είδος της βοήθειας που είναι διαθέσιμο.

References

1. Maurer M *et al.* Unmet clinical needs in chronic spontaneous urticaria a GA2LEN task force report. *Allergy*; 2011;66:317-330.

2. Axelrod S, Davis-Lorton M. Urticaria and Angioedema. *Mt Sinai J Med*; 2011;78:784-802.

3. Balp M-M *et al.* The Impact of Chronic Urticaria from the Patient's Perspective: A Survey in Five European Countries. *Patient*; 2015;6:551-8.

Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να αντικαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμοδίου επαγγελματία υγείας.

Την επιστημονική επιμέλεια και ευθύνη έχει το Ιατρικό Τμήμα της φαρμακευτικής εταιρείας Novartis (Hellas) AEBE. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2102811712.

Η αναπαραγωγή από μέσα μαζικής ενημέρωσης για λόγους ενημέρωσης του κοινού επί επίκαιρων γεγονότων γίνεται υπό την ευθύνη τους.

Σε περιπτώσεις περιλήψεων, αποσπασμάτων ή φωτογραφικού υλικού, θα πρέπει να αναφέρεται ως πηγή η Novartis Hellas.